



Nazorg formulier TPLO knie operatie

Uw hond heeft een knie-operatie ondergaan met een TPLO-techniek. Hieronder wordt stapsgewijs de juiste manier van revalidatie beschreven. Na de operatie is een goede nazorg erg belangrijk. Veel honden komen na de operatie in de verleiding om te snel teveel te bewegen.

Hoe goed uw hond zich ook voelt: het is heel belangrijk dat uw hond niet los mag lopen, niet mag rennen, springen of ruig spelen met andere dieren voor de komende 6 weken!

- Geef uw hond bij thuiskomst een rustig en warm plekje.
- Een bek van een hond bevat altijd bacteriën welke de operatiewond kunnen infecteren. Uw hond mag dan ook absoluut NIET aan de wond likken/bijten. De kraag/broek moet daarom gedurende 10 dagen gedragen worden om dit te voorkomen.
- 's Avonds mag uw hond een halve portie eten en gewoon drinken. Het is niet erg als hij/zij nog niets wil eten. Het kan zijn dat uw hond misselijk is van de narcose. De volgende dag moet hij/zij wel weer willen eten.
- Controleer iedere dag de operatiewond van uw hond.
- De eerste 2-3 dagen mag u de knie koelen. Doe dit drie keer per dag 5 minuten lang. Als uw huisdier dit niet toe laat, stop dan. U kunt een koelpack gebruiken, doe hier wel een theedoek/handdoek omheen.
- Uw hond krijgt medicatie mee:
 - Pijnstillende ontstekingsremmer, u geeft dit 1x daags met wat voer gedurende 6 weken
 - Extra pijnstilling, u mag dit naast het andere medicijn 3 tot 4x per dag geven gedurende 3 dagen.
 - Antibiotica: u geeft dit 2 keer per dag en maakt de kuur af.
 - Extra medicatie: _____

In de poot van uw hond is een zaagsnede gemaakt, welke is vastgezet met een plaat en schroeven. Dit heeft de tijd nodig om goed te genezen. Te snelle belasting van de poot kan ervoor zorgen dat het bot of de schroeven/plaat breekt. Dit willen we absoluut voorkomen, volg daarom het onderstaande schema.

De 1^e en 2^e week:

Het is belangrijk dat de hond vanaf dag 1 zijn poot gedoseerd beweegt. De eerste 14 dagen moet u korte wandelingen aan de lijn maken van 5-10 minuten gedurende 6-8 keer per dag.

Maak langzame wandelingen en moedig uw hond daarbij aan om zijn geopereerde poot gedoseerd te bewegen. Ga niet zwemmen met uw hond en zorg ervoor dat uw hond niet vrij rent in huis. Een verband om de wond is na deze operatie niet nodig.

3^e en 4^e week:

Wandelingen aan de lijn mogen in deze weken verlengd worden naar 10-20 minuten per keer.

5^e en 6^e week:

In deze tijd mag de hond langere wandelingen maken (30 minuten of meer), maar nog wel aan de lijn.

Aan het einde van de 6^e week wordt er een controle röntgenfoto gemaakt, indien alles in orde is mag de hond af en toe los lopen aan het eind van een wandeling (gedurende ongeveer 5 minuten). Doet u dit dan wel op een rustig veldje/uitlaatplek waar geen andere honden zijn.



Binnen 5-7 dagen na de operatie verwachten we al een vorm van steun name (aantippen/licht belasten). De meeste honden kunnen weer hun normale bewegingspatroon volgen in ongeveer 12 weken na de operatie. Soms komt het voor dat de poot nog een klein beetje stijf is, maar dat moet vanzelf minder worden als de hond zijn normale bewegingspatroon weer heeft.

Fysiotherapie in de latere fase van het herstel kan helpen om spierverlies te voorkomen en het herstel te versnellen. U kunt bij ons op de praktijk naar meer informatie vragen over fysiotherapie bij dieren.

Tip: Hersenwerk/hondenpuzzels kunnen helpen om uw hond rustig te houden. Door daar gebruik van te maken worden kunnen ze toch (op een andere manier) hun energie kwijt.

Ten slotte: Controleer iedere dag de operatiewond van uw hond. Mocht de wond gaan opzetten, bloeden, erg rood of wat vochtig worden, of uw hond wordt eerder slomer dan dat hij/zij verder bijkomt uit de narcose, neem dan direct contact met ons op en wacht niet af. Liever eenmaal te vaak gebeld dan te weinig!

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op: 0342-418080.

Afspraak controle na 10 dagen: _____ om: _____ uur

Afspraak controle na 6 weken: _____ om: _____ uur