



Nazorg keizersnede hond

Uw hond heeft vandaag een keizersnede gehad. Naast de zorg die wij bieden op de praktijk ligt er ook een verzorgende taak op u te wachten. Door middel van dit formulier kunt u niets over het hoofd zien en zal het herstel van uw dier zo spoedig mogelijk verlopen.

- Zorg thuis voor rust voor moeder en pups.
- Het is ontzettend belangrijk dat het nest niet op de tocht ligt. Een te koude omgevingstemperatuur is sterfteoorzaak nummer 1 bij pups. De eerste week moet het tussen de 25-30 graden zijn.
- Het is aan te raden de pups iedere dag op hetzelfde tijdstip te wegen, zodat u goed in de gaten kunt houden of alle pups even goed groeien. Pups moeten vanaf de geboorte elke dag aankomen. Mocht een pup niet aankomen of zelfs afvallen, dan is het belangrijk om de pup(s) zelf bij te gaan voeren met daarvoor geschikte puppemelk. Deze speciale melk is bij ons verkrijgbaar.
- Het is belangrijk iedere dag de temperatuur van de moederhond op te meten. Als de temperatuur boven de 39,5 komt, vragen wij u dezelfde dag nog contact met ons op te nemen.
- Een bek van een hond bevat altijd bacteriën welke de operatiewond kunnen infecteren. Uw hond mag dan ook niet de wond likken/bijten. Meestal blijven moederhonden goed van de operatiewond af, maar hou dat goed in de gaten. Pups geven tijdens het drinken eigenlijk nooit problemen met de operatiewond. Uw hond krijgt geen kraag mee of romper mee, omdat ze dan niet de pups kan verzorgen of voeden.
- Controleer iedere dag de operatiewond van uw hond.
- 2-4 uur na de operatie mag uw hond een halve portie eten en gewoon drinken. Het is niet erg als zij nog niets wil eten. Het kan zijn dat uw hond misselijk is van de narcose. Ook de volgende dag kan zij nog erg moe van zijn van de narcose. De volgende dag moet zij wel weer willen eten.
- Hoe goed de moederhond hond zich ook voelt, het is belangrijk dat uw hond niet los mag rennen, springen en/of ruig spelen met andere dieren voor de komende 10 dagen.
- Na de keizersnede kan de moederhond nog (veel) uitvloeiing uit de vulva hebben, net zoals gebeurt bij een normale bevalling. In het begin kan dit groen zijn, meestal ziet het eruit als (oud) bloed. Binnen twee weken moet de hoeveelheid uitvloeiing minder worden. Indien uw hond na twee weken nog steeds veel uitvloeiing heeft, moet u contact met ons opnemen.

Bij uw hond is de operatie wond gesloten met:

Oplosbare onderhuidse / onoplosbare huid hechtingen

Op de 10e dag na de operatie wordt een controle afspraak gepland om de wond te controleren en indien nodig hechtingen te verwijderen. Aan deze controles zijn geen kosten verbonden mits de wond mooi genezen is en uw hond verder geen medicijnen of extra behandeling nodig hebben.

Ten slotte: pasgeboren pups zijn enorm kwetsbaar. De factoren waar zij snel aan kunnen overlijden zijn te weinig voedsel en te weinig warmte. Hou deze punten goed in de gaten, en bij twijfel of het goed gaat neem liever een keer te vaak dan te weinig contact met ons op.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op: 0342-418080.