



## Nazorg keizersnede kat

Uw kat heeft vandaag een keizersnede gehad. Naast de zorg die wij bieden op de praktijk ligt er ook een verzorgende taak op u te wachten. Door middel van dit formulier kunt u niets over het hoofd zien en zal het herstel van uw dier zo spoedig mogelijk verlopen.

- Zorg thuis voor voldoende rust voor uw kat en de kittens.
- Het is ontzettend belangrijk dat het nest niet op de tocht ligt. Een te koude omgevingstemperatuur is sterfteoorzaak nummer 1 bij kittens. De eerste week moet het tussen de 25-30 graden zijn.
- Het is aan te raden de kittens iedere dag op hetzelfde tijdstip te wegen, zodat u goed in de gaten kunt houden of alle kittens even goed groeien. Kittens moeten vanaf de geboorte elke dag aankomen. Mocht een kitten niet aankomen of zelfs afvallen, dan is het belangrijk om de kitten(s) zelf bij te gaan voeren met kittenmelk. Dit is anders dan 'gewone' kattenmelk. Deze speciale melk is bij ons verkrijgbaar.
- Controleer de eerste dagen elke dag de temperatuur van de moederpoes. Deze moet onder de 39,5 blijven. Is de temperatuur hoger dan dit? Neem dan z.s.m. contact met ons op.
- De operatie wond is onderhuids gesloten met hechtingen die vanzelf oplossen. Meestal gaan katten dan ook niet aan deze wond zitten, maar een bek van een kat bevat altijd bacteriën welke de operatiewond kunnen infecteren. Uw kat mag dan ook niet aan de wond likken/bijten. Kittens geven tijdens het drinken gelukkig eigenlijk nooit problemen met de operatiewond. Uw kat krijgt geen kraag of romper mee, omdat ze dan niet de kittens kan verzorgen of kan voeden. Hou zelf goed in de gaten of zij aan haar wond likt. Vaak valt dit heel erg mee.
- Controleer iedere dag de operatiewond van uw kat.
- 2-4 uur na de operatie mag uw kat een halve portie eten en gewoon drinken. Het is niet erg als zij nog niets wil eten. Het kan zijn dat uw kat misselijk is van de narcose. Ook de volgende dag kan zij nog erg moe van zijn van de narcose. De volgende dag moet zij wel weer willen eten.
- Na de keizersnede kan de moederkat nog uitvloeiing uit de vulva hebben, net zoals gebeurt bij een normale bevalling. In het begin kan dit groen zijn, meestal ziet het eruit als (oud) bloed. De uitvloeiing hoort niet te stinken. Binnen twee weken moet de hoeveelheid uitvloeiing minder worden. Indien uw kat na twee weken nog steeds veel uitvloeiing heeft, moet u contact met ons opnemen.
- Hoe goed de moederkat zich ook voelt, het is belangrijk dat uw kat niet naar buiten gaat de komende 10 dagen.
- Op de 10e dag na de operatie adviseren we u om een foto te sturen van de wond ter controle. Als u erg twijfelt, dan kunt u natuurlijk met de moederpoes ook langs komen voor de controle. Om zo veel mogelijk stress te voorkomen, doen we dat liever niet standaard. Aan deze controles zijn geen kosten verbonden mits de wond mooi genezen is en uw kat verder geen medicijnen of extra behandeling nodig hebben.

Ten slotte: pasgeboren kittens zijn enorm kwetsbaar. De factoren waar zij snel aan kunnen overlijden zijn te weinig voedsel en te weinig warmte. Hou deze punten goed in de gaten, en bij twijfel of het goed gaat neem liever een keer te vaak dan te weinig contact met ons op. Liever eenmaal te vaak gebeld dan te weinig!

**Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op: 0342-418080.**

*Wij zijn een **catfriendly gold** praktijk. Dit betekent dat wij ook achter de schermen ervoor zorgen dat het bezoek van uw kat met zo min mogelijk stress verloopt. De opname ruimte en narcose zijn hier voor speciaal aangepast. Daarnaast hebben onze dierenartsen en paraveterinair extra kennis in huis over kattengedrag, pijnsignalen en kattengeneeskunde, zodat uw kat zo min mogelijk stress of angst ervaart tijdens zijn bezoek hier.*

